

Wirksamkeit von Pflanzenstärkungsmitteln bei der Bekämpfung des Echten Mehltaus (*Erysiphe heraclii*) an Petersilie

Aussaat 27.01.2010

Sorte ‚Verta‘

10 Töpfe pro Wiederholung

4 Wdhg.,

künstl. Infektion am 02. und 09.03.2010

Bonitur: Befall in % pro Topf in 10 Töpfen je Parzelle

Schlussbonitur am 29.03.

Versuchsvarianten

	26.02. vorbeugend	01.03. vorbeugend	12.03. nach Infektion	15./16.03. Befalls- beginn	23.03. Befall
Signum 1,5 kg/ha				x	
Frutogard 4 l/ha	x		x		x
AQ10 0,07 g/l + Nu-Film P 0,3 l/ha				x	x
Enzicur I + II je 1 ml/l + ADDIT 2,5 ml/l				x	x
Kendal 2,5 l/ha	x		x		x
Trichostar 10,0 l/ha				x	x
Green Fit AgC 0,1 l/ha + ProAct 0,1 g/ha	x		x		x
ELOT-VIS 10 %	x		x		x
Vitisan 0,5 % + HF-Pilzvor. 0,3 %		x	x		x
VACCIPLANT 0,75 l/ha	x		x		x





